



TYMAI IR PARVOVIRUSAS. KAIP ATPAŽINTI?



Nacionalinis
visuomenės
sveikatos
centras

TYMAI

Plitimas: oro lašeline keliu, per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas ar kitus aplinkos daiktus.

Simptomai:

- temperatūra iki 38-39 °C,
- akių junginės uždegimas,
- sloga,
- kosulys,
- smulkios balkšvos dėmelės skruostų srityje,
- bėrimo elementai ausų, veido, kaklo srityje, vėliau –liemens, rankų, šlaunų, blauzdų ir pėdų.

PARVOVIRUSAS B19

Plitimas: oro lašeline keliu, per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas ar kitus aplinkos daiktus bei per kraują ir placentą.

Simptomai:

- neaukšta temperatūra,
 - skruostų paraudimas,
 - galvos skausmas,
 - gerklės skausmas,
 - sąnarių skausmai,
 - kosulys,
- bėrimas (gali būti niežtintis, ypač kojų padų srityje) krūtinės, nugaros, sėdmenų, rankų ir kojų srityse. „Nėrinuoto“ bėrimo vaizdas pradėjus jam nykti.

Gydymas: simptominis.

Komplikacijos: vidurinės ausies uždegimas, plaučių uždegimas, laringitas (gerklų gleivinės uždegimas), viduriavimas, encefalitas (smegenų uždegimas).

Vakcinacija: skiepai tymų, raudonukės, epideminio parotito konjuguota (MMR) vakcina.

Komplikacijos: iki 20-os nėštumo savaitės, virusas gali sukelti persileidimą arba vaisiaus vandenligę. Kraujo ligomis sergantiems asmenims – anemiją.

Vakcinacija: –

Prevencija: Dažnas rankų plovimas muilu ir vandeniu, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo laikymasis, vengimas liesti akis, nosį ir burną, nekontaktavimas su sergančiais žmonėmis, pasilikimas namuose, kai sergama.

Diagnostika: serologiniai ir molekuliniai (tiksliausi) tyrimai, siekiant atskirti tymų susirgimą nuo parvovirusinės B19 infekcijos.



[Daugiau informacijos apie tymus ir parvovirusinę infekciją.](#)

nvsc.lrv.lt