

**UŽSIKRĖTUSIŲJŲ LYTIŠKAI PLINTANČIOMIS INFEKCIJOMIS IR  
ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSU  
EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE**

**2023 metai**



**Vilnius  
2024**

***ATASKAITA PARENGĖ:***

*Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius*

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, 2024  
<https://www.nvsc.lrv.lt/lt>

## TURINYS

1. SERGAMUMO ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIOMIS INFEKCIJOMIS (LPI) TENDENCIJOS .....	4
2. ŽIV INFEKCIJOS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS .....	5
3. SIFILIO EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS .....	11
4. GONORĖJOS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS.....	16
5. CHLAMIDIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS .....	21
6. DUOMENYS APIE ATLIKTUS TYRIMUS DĖL ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ .	26
7. DUOMENYS APIE ATLIKTUS TYRIMUS DĖL ŽIV PAGAL TIRIAMĄSIAS GRUPES .....	27
1 PRIEDAS. Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis infekcijomis Lietuvoje 2021–2023 metais pagal savivaldybes .....	28


# 1. SERGAMUMO ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIOMIS INFEKCIJOMIS (LPI) TENDENCIJOS<sup>1</sup>

2023 m., lyginant su 2022 m., sergamumas gonorėja ir chlamidioze išliko panašus, sifilio sergamumas sumažėjo, o ŽIV sergamumas padidėjo neženkliai (1 grafikas).

Sergamumas ŽIV infekcija 2023 m., lyginant su 2022 m., padidėjo 0,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų, nuo 8,9 iki 9,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų<sup>2</sup>. ŽIV sergamumo rodiklis, neįtraukiant užsieniečių, 2023 m. sudarė 5,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sergamumas sifiliu 2020 m. buvo sumažėjęs (1,97 atvejo 100 tūkst. gyventojų), 2021 m. jis padidėjo (4,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų), o 2023 m. vėl sumažėjo (2,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų). Sergamumas gonorėja per 2020–2023 m. išliko panašus (100 tūkst. gyventojų). Sergamumas chlamidioze nuo 2020 m. didėja: nuo 6,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų 2020 m. iki 9,1 atvejo 2023 m. (1 grafikas).

1 grafikas. Sergamumas sifiliu, gonorėja, chlamidioze, ŽIV infekcija Lietuvoje 2012–2023 m. 100 tūkst. gyventojų.



<sup>1</sup> Analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

<sup>2</sup> Įtraukti užsieniečiai

## 2. ŽIV INFEKCIJOS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) duomenimis, 2023 m. Lietuvoje užregistruoti 267 ŽIV infekcijos atvejai. Atitinkamai 2022 m. registruoti 252, 2021 m. – 121, 2020 m. – 139, 2019 m. – 151, 2018 m. – 160, 2017 m. – 263 ŽIV infekcijos atvejai.

Lyginant su 2022 m., sergamumo ŽIV infekcija rodiklis 2023 m. padidėjo nežymiai, nuo 8,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų iki 9,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. 37,8 proc. visų užregistruotų ŽIV infekcijos atvejų 2023 m. sudarė užsieniečiai.

Aukščiausias sergamumo ŽIV infekcija rodiklis 10 tūkst. gyventojų 2023 m. užregistruotas Vilniaus apskrityje, žemiausias – Marijampolės ir Telšių apskrityse (1 lentelė).

1 lentelė. Sergamumas<sup>3</sup> ŽIV infekcija pagal apskritis 2019–2023 metais

Eil. Nr.	Apskritis	Iš viso užregistruota susirgimų*					Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv.*				
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022m.	2023 m.
1.	Vilniaus	72	57	58	68	65	0,88	0,69	0,76	0,82	0,76
2.	Kauno	22	15	9	19	31	0,39	0,27	0,16	0,33	0,53
3.	Klaipėdos	18	26	19	18	20	0,56	0,81	0,59	0,55	0,59
4.	Šiaulių	12	8	12	8	19	0,46	0,31	0,46	0,30	0,72
5.	Panevėžio	5	7	4	6	7	0,23	0,33	0,19	0,28	0,33
6.	Alytaus	3	8	0	6	12	0,22	0,60	0,0	0,44	0,89
7.	Marijampolės	4	6	5	4	1	0,29	0,44	0,36	0,29	0,07
8.	Tauragės	2	3	2	2	5	0,22	0,33	0,22	0,22	0,55
9.	Telšių	6	2	3	1	1	0,46	0,15	0,23	0,08	0,08
10.	Utenos	1	1	1	1	4	0,08	0,08	0,08	0,08	0,32

\* neįtraukti užsieniečiai 2019 m.-6, 2020 m.-6, 2021 m.-8, 2022 m.-119, 2023 m.-101; bei asmuo, kurio gyvenamoji vieta nurodyta Teisingumo ministerijos pavaldžios įstaigos 2023 m. -1

Analizuojant 2023 m. duomenis (267) pagal lytį, matyti, kad 66,7 proc. (178) visų užsikrėtusiųjų ŽIV sudarė vyrai, 33,3 proc. (89) – moterys.

Kas penktas (19,5 proc.) ŽIV užsikrėtęs asmuo abiejų lyčių grupėse buvo 35–39 metų amžiaus (19,1 proc. – tarp vyrų, 20,2 proc. – tarp moterų) ir 40–44 metų amžiaus (po 18,0 proc.) (2 lentelė).

2 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2023 metais

Amžiaus grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
0–14	2	1,1	2	2,2	4	1,5
15–19	1	0,6	3	3,4	4	1,5
20–24	12	6,7	2	2,2	14	5,2
25–29	18	10,1	3	3,4	21	7,9
30–34	29	16,3	9	10,1	38	14,2
35–39	34	19,1	18	20,2	52	19,5
40–44	32	18,0	16	18,0	48	18,0
45–49	17	9,6	17	19,1	34	12,7
50–54	15	8,4	6	6,7	21	7,9
55+	18	10,1	13	14,6	31	11,6
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0*</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>

\* apvalinta iki sveiko skaičiaus

<sup>3</sup> Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyventojų (pagal formą Nr. 4 – sveikata, metinė)

54,7 proc. (146) užsikrėtusiųjų ŽIV turėjo vidurinį, 16,5 proc. (44) – aukštąjį, 10,9 proc. (29) – pagrindinį, 4,1 proc. (11) – profesinį, 2,6 proc. (7) – pradinį išsilavinimą, 10,1 proc. (27) asmenų išsilavinimas nebuvo nurodytas, 3 ŽIV užsikrėtę neįgijo išsilavinimo dėl amžiaus.

2023 m. 81,6 proc. (218) užsikrėtusiųjų ŽIV diagnozės nustatymo metu turėjo socialinį draudimą, 14,6 proc. (39) buvo socialiai nedrausti, 3,7 proc. (10) – atvejo registravimo protokole (f. Nr. 151-9/a) draustumas buvo nenurodytas.

Tarp 2023 m. nustatytų ŽIV užsikrėtusių asmenų 42,7 proc. (114) buvo darbininkai, 16,9 proc. (45) – bedarbiai, 9,4 proc. (25) – tarnautojai, 1,5 proc. (4) pabėgėliai / prieglobsčio prašytojai, 6,7 proc. (18) kaliniai / sulaikytieji, 1,5 proc. (4) moksleiviai, 3,4 proc. (9) neįgalieji, 0,4 proc. (1) vairuotojas, 3,7 proc. (10) studentai. 4,5 proc. (12) užsikrėtusiųjų ŽIV sudarė kitos socialinės grupės asmenys ir 6,4 proc. (17) ši informacija nepateikta. Analizuojant pagal lytį, daugiau moterų (46,1 proc.), užsikrėtusiųjų ŽIV, priklausė darbininkų socialinei grupei, kas antra (22,5 proc.) buvo bedarbė. Du penktadaliai (41,0 proc.) ŽIV užsikrėtusių vyrų buvo atitinkamai darbininkai, po dešimtadalį (14,0 proc.) – bedarbiai ir tarnautojai (10,1 proc.) (3 lentelė).

3 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV pasiskirstymas pagal socialinę grupę 2023 metais

Socialinė grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Bedarbiai	25	14,0	20	22,5	45	16,9
Benamiai	1	0,6	1	1,1	2	0,7
Darbininkai	73	41,0	41	46,1	114	42,7
Tarnautojai	18	10,1	7	7,9	25	9,4
Studentas	10	5,6	0	0,0	10	3,7
Pabėgėliai	2	1,1	2	2,2	4	1,5
Kita grupė	9	5,1	3	3,4	12	4,5
Nenurodyta	12	6,7	5	5,6	17	6,4
Kalinys/sulaikytas	18	10,1	0	0,0	18	6,7
Neįgalusis	4	2,2	5	5,6	9	3,4
Moksleivis	0	0,0	4	4,5	4	1,5
Pensininkas	5	2,8	1	1,1	6	2,2
Vairuotojas	1	0,6	0	0,0	1	0,4
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0*</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>

\* apvalinta iki sveiko skaičiaus

Duomenys pagal galimą užsikrėtimo būdą 2023 m. pasiskirstė taip: 52,1 proc. (139) asmenų ŽIV infekcija užsikrėtė heteroseksualių santykių metu, 16,5 proc. (44) – vartodami švirksčiamuosius narkotikus, 15,7 proc. (42) – homoseksualių santykių metu, registruoti 3 perinatalinio užsikrėtimo ŽIV atvejai (du užsieniečiai), 14,6 proc. (39) užsikrėtimo būdas nežinomas. Analizuojant užsikrėtimo būdo pasiskirstymą pagal lytį, nustatyta, kad 2 kartus didesnė dalis moterų (79,8 proc.), lyginant su vyrais (38,2 proc.), galimai užsikrėtė ŽIV heteroseksualių santykių metu (4 lentelė).

4 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV pasiskirstymas pagal galimą užsikrėtimo būdą 2023 metais

Galimas užsikrėtimo būdas	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Heteroseksualinis kontaktas	68	38,2	71	79,8	139	52,1
Homoseksualinis kontaktas	42	23,6	0	0,0	42	15,7
Švirkščiamųjų narkotikų vartojimas	36	20,2	8	9,0	44	16,5
Iš motinos vaikui	2	1,1	1	1,1	3	1,1
Nežinomas	30	16,9	9	10,1	39	14,6
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0*</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>

Atsitiktinį lytinį partnerį kaip galimą infekcijos šaltinį nurodė 8,2 proc. (22) ŽIV užsikrėtusių asmenų. Didžioji dalis – 59,6 proc. (159) nežinojo, nuo ko galėjo užsikrėsti, 14,2 proc. (38) užsikrėtusiųjų ŽIV nurodė sutuoktinį ar sugyventinį, 6,4 proc. (17) – pažįstamą, 3,0 proc. (8) – nuolatinį lytinį partnerį, 1,5 proc. (4) – lytines paslaugas už atlygį teikiantį asmenį.

Tariamo ŽIV infekcijos šaltinio pagal lytį analizė parodė, kad 46,1 proc. (41) moterų tariamo ŽIV infekcijos šaltinio nežinojo, 32,6 proc. (29) moterų nurodė savo sutuoktinį ar sugyventinį. Beveik trys ketvirtadaliai – 66,3 proc. (118) vyrų infekcijos šaltinio nežinojo ir 11,2 proc. (20) nurodė, kad galėjo užsikrėsti nuo atsitiktinio asmens (5 lentelė).

5 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV pasiskirstymas pagal tariamą užsikrėtimo šaltinį 2023 metais

Tariamasis užsikrėtimo šaltinis	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė)	9	5,1	29	32,6	38	14,2
Nežinoma	118	66,3	41	46,1	159	59,6
Pažįstamas	11	6,2	6	6,7	17	6,4
Nuolatinis lytinis partneris	6	3,4	2	2,2	8	3,0
Atsitiktinis asmuo	20	11,2	2	2,2	22	8,2
Asmuo, teikiantis lytines paslaugas už atlygį	4	2,2	0	0,0	4	1,5
Kita	1	0,6	4	4,5	5	1,9
Tėvai	2	1,1	1	1,1	3	1,1
Nenurodyta	7	3,9	4	4,5	11	4,1
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0*</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>

\* apvalinta iki sveiko skaičiaus

3,4 proc. (9) asmenų, užsikrėtusiųjų ŽIV infekcija, teigė, jog per pastaruosius 6 mėnesius neturėjo lytinių santykių su asmenimis, teikiančiais lytines paslaugas už atlygį.

40,1 proc. (107) užsikrėtusiųjų ŽIV asmenų nurodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių turėjo vieną lytinį (-ę) partnerį (-ę), 11,2 proc. (30) – du ar tris, 7,5 proc. (20) – keturis arba daugiau.

Analizuojant partnerių skaičiaus pasiskirstymą pagal lytį, nustatyta, kad partnerių kaita būdinga labiau ŽIV užsikrėtusiems vyrams nei moterims: 55,1 proc. (49) moterų ir 32,6 proc. (58) vyrų nurodė, kad turėjo vieną lytinį (-ę) partnerį (-ę). 5,6 proc. (5) moterų ir 14,0 proc. (25) vyrų nurodė, kad turėjo du ar tris lytinius (-es) partnerius (-es) per pastaruosius 12 mėnesių, keturis ir daugiau lytinių partnerių nurodė 2,2 proc. (2) moterų ir 10,1 proc. (18) vyrų (6 lentelė).

6 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėnesių 2023 metais

Partnerių skaičius per paskutiniuosius 12 mėn.	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1	58	32,6	49	55,1	107	40,1
2–3	25	14,0	5	5,6	30	11,2
>= 4	18	10,1	2	2,2	20	7,5
Nenurodyta	29	16,3	11	12,4	40	15,0
Nežinoma	7	3,9	0	0,0	7	2,6
Neturėjo	41	23,0	22	24,7	63	23,6
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0*</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>

\* apvalinta iki sveiko skaičiaus

Analizuojant informaciją apie naudojamą prezervatyvais, nustatyta, kad 12,7 proc. (34) užsikrėtusiųjų ŽIV jais naudojami retai, 45,7 proc. (122) iš viso nesinaudoja. Vidutiniškai prezervatyvais lytinių santykių metu naudojami 7,9 proc. (21), visada – 3,0 proc. (8), dažnai – 10,1 proc. (27) užsikrėtusiųjų ŽIV, 18,7 proc. (50) atvejo registravimo protokolų ši informacija nenurodyta ir 1,9 proc. (5) nežinoma.

Analizė dėl naudojimosi prezervatyvais pagal lytį parodė, kad 2,2 proc. (2) moterų visada naudojosi prezervatyvais, 7,9 proc. (7) – dažnai, 5,6 proc. (5) – vidutiniškai. 56,2 proc. (50) moterų nurodė, kad prezervatyvais nesinaudoja, 11,2 proc. (10) – naudojami retai. Visada naudojosi prezervatyvais 3,4 proc. (6) ŽIV užsikrėtusių vyrų, dažnai – 11,2 proc. (20), vidutiniškai – 9,0 proc. (16) vyrų. 13,5 proc. (24) vyrų nurodė, kad prezervatyvais naudojami retai, 40,4 proc. (72) – nesinaudoja (7 lentelė).

7 lentelė. Užsikrėtusiųjų ŽIV naudojimosi prezervatyvais dažnumas 2023 metais

Naudojasi prezervatyvais	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Visada (100 proc.)	6	3,4	2	2,2	8	3,0
Dažnai (75–100 proc.)	20	11,2	7	7,9	27	10,1
Vidutiniškai (26–74 proc.)	16	9,0	5	5,6	21	7,9
Retai (1–25 proc.)	24	13,5	10	11,2	34	12,7
Nesinaudoja (0 proc.)	72	40,4	50	56,2	122	45,7
Nežinoma	5	2,8	0	0,0	5	1,9
Nenurodyta	35	19,7	15	16,9	50	18,7
<b>Iš viso</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>267</b>	<b>100,0</b>


31,8 proc. (85) ŽIV užsikrėtusiųjų pacientų buvo pradėtas kontaktinių asmenų nustatymas. Iš viso nurodyti kontaktiniai asmenys.

Tarp visų registruotų ŽIV infekcijos atvejų 2023 m. Lietuvoje 101 buvo užsienietis, iš kurių vyrai sudarė 61,4 proc. (62), moteris 38,6 proc. (39). Tarp užsieniečių, kuriems 2023 m. buvo registruota ŽIV infekcija, 66,3 proc. (67) galimai užsikrėtę heteroseksualių lytinių santykių metu, 14,9 proc. (15) homoseksualių lytinių santykių metu, 4,95 proc. (5) vartodami švirksčiamuosius narkotikus, 11,9 proc. (12) užsikrėtimo būdas nežinomas, 1,98 proc. (2) buvo nurodytas perinatalinis užsikrėtimo būdas. Aštuoni iš dešimties (81,2 proc.) buvo 30–49 metų amžiaus. 2023 m. tarp registruotų ŽIV užsikrėtusių užsieniečių 86,1 proc. (87) atvyko iš Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Rytų Europos regiono šalių (Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Kirgizijos, Latvijos, Sakartvelo, Moldovos); 0,99 proc. (1) iš PSO Vakarų Europos regiono šalių (Italijos), 6,9 proc. (7) iš PSO Afrikos regiono šalių (Nigerijos ir kitų Afrikos šalių (šalys nebuvo nurodytos)), 4,95 proc. (5) iš PSO Amerikos regiono šalių (Argentinos, Kolumbijos, Kubos, Jungtinių Amerikos valstijų) (2 grafikas). Europos ligų prevencijos ir

kontrolės centras (toliau – ELPKC) pažymi, kad nuo 2022 m. yra padidėjęs gyventojų judėjimas visoje Europoje. Šis veiksnys turėjo įtakos ŽIV epidemiologinėms tendencijoms, ypač Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (toliau – ES/EEE). Pažymima, kad Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regione ŽIV epidemiologinėms tendencijoms įtakos turėjo ne tik padidėjęs žmonių judėjimas (migracija), bet ir sveikatos paslaugų prieinamumo padidėjimas po COVID-19 pandemijos, naujų inovacijų ir strategijų įdiegimas daugelyje šalių, dėl kurių buvo identifikuoti anksčiau nediagnozuoti atvejai. Todėl PSO ir ELPKC ataskaitoje už 2022 m. nurodyta, kad žymiai išaugo registruotų ŽIV atvejų skaičius visame PSO Europos regione. Nurodoma, kad 2022 m. 37 iš 49 šalių PSO regione, įskaitant 26 ES/EEE šalis, buvo diagnozuota daugiau ŽIV atvejų negu 2021 m. Kai kurios šalys pranešė apie rekordiška padidėjusius diagnozuotų atvejų skaičius. Iš viso Europos regione 2022 m. 26,7 proc. visų užregistruotų ŽIV infekcijos atvejų sudarė migrantai, o ES/EEE šalyse šis skaičius sudarė 48,3 proc.

Lyginant 2023 m. užregistruotų ŽIV atvejų skaičių pasiskirstymą pagal lytį tarp Lietuvos gyventojų ir užsieniečių, vyrų Lietuvos gyventojų buvo 69,9 proc. (116), o užsieniečių 61,4 proc. (62); moterų atitinkamai 30,1 proc. (50) ir 38,6 proc. (39). Lyginant 2023 m. užregistruotų ŽIV atvejų skaičių pasiskirstymą pagal užsikrėtimo būdą tarp Lietuvos gyventojų ir užsieniečių, 43,93 proc. (73) Lietuvos gyventojų galimai užsikrėtę heteroseksualių lytinių santykių metu, 16,3 proc. (27) homoseksualių lytinių santykių metu, 23,5 proc. (39) vartodami švirksčiamuosius narkotikus, 15,7 proc. (26) užsikrėtimo būdas nežinomas, registruotas vienas perinatalinio ŽIV perdavimo atvejis. Tarp užsieniečių pasiskirstymas atitinkamai 66,3 proc. (67), 14,9 proc. (15), 4,95 proc. (5), 11,9 proc. (12) ir 1,98 proc. (2).

**2 grafikas. Užregistruotų ŽIV atvejų Lietuvos gyventojų ir užsieniečių pasiskirstymas pagal lytį, amžiaus grupes, galima užsikrėtimo būdą ir kilmės šalį 2023 metais\***



\*Sutrumpinimai: hetero - heteroseksualių lytinių santykių metu; homo - homoseksualių lytinių santykių metu; ŠNV - vartodami švirksčiamuosius narkotikus, než - užsikrėtimo būdas nežinomas

**Išvados:**

- 2023 m. užregistruoti 267 ŽIV infekcijos atvejai (178 – tarp vyrų ir 89 – tarp moterų).
- Sergamumo ŽIV infekcija rodiklis 2023 m., lyginant su 2022 m., padidėjo nežymiai (nuo 8,9 iki 9,3 atvejo 100 tūkst. gyv.). Aukščiausias sergamumo ŽIV rodiklis 2023 m. registruotas Vilniaus apskrityje, žemiausias – Marijampolės ir Telšių apskrityse.
- Kas antras ŽIV užsikrėtęs asmuo buvo 30–44 metų amžiaus ir turėjo vidurinį išsilavinimą. Užsikrėtusių vyrų šioje amžiaus grupėje 2 kartus daugiau nei moterų.
- Dažniausias užsikrėtimo ŽIV būdas – lytinis: 67,8 proc. (52,1 proc. – heteroseksualus ir 15,7 proc. – homoseksualus); švirkščiamųjų narkotikų vartojimas – 16,5 proc. atvejų, 14,6 proc. atvejų užsikrėtimo būdas nežinomas. Registruoti 3 perinatalinio ŽIV perdavimo atvejai – du iš jų užsienio šalių piliečiai, atvykę į Lietuvą.
- Daugiau negu pusė užsikrėtusiųjų ŽIV nesinaudoja arba naudojami retai prezervatyvais, galinčiais sumažinti ŽIV perdavimo riziką, nesinaudoja arba naudojami retai.
- 37,8 proc. visų užregistruotų ŽIV infekcijos atvejų 2023 m. sudarė atvykę užsienio šalių gyventojai, iš kurių dauguma Rytų Europos PSO regiono šalių gyventojai.

### 3. SIFILIO EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS

2023 m. Lietuvoje užregistruoti 76 susirgimai sifiliu, iš jų užregistruotas 1 įgimto sifilio atvejis. 2021 m. sergamumas sifiliu siekė 4,2 atvejo, 2022 m. – 3,0 atvejo, o 2023 m. siekė – 2,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Aukščiausias sergamumas 2023 m. registruotas Vilniaus, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse (8 lentelė).


8 lentelė. Sergamumas sifiliu pagal apskritis 2021–2023 metais 10 tūkst. gyventojų

Eil. Nr.	Apskritis	Iš viso užregistruota susirgimų			Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv.		
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.	Vilniaus	66	56	43	0,81	0,67	0,49
2.	Kauno	26	14	10	0,46	0,24	0,17
3.	Klaipėdos	4	4	6	0,12	0,12	0,18
4.	Šiaulių	4	6	4	0,15	0,23	0,15
5.	Panevėžio	2	0	5	0,09	0,00	0,24
6.	Alytaus	3	1	2	0,22	0,07	0,15
7.	Marijampolės	2	1	3	0,15	0,07	0,22
8.	Tauragės	2	1	0	0,22	0,11	0,00
9.	Telšių	2	1	1	0,15	0,08	0,08
10.	Utenos	6	2	2	0,47	0,16	0,16
	<b>VISO</b>	<b>117</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>0,42</b>	<b>0,30</b>	<b>0,26</b>

Įgyto sifilio atvejų (75) analizė rodo, kad 41,3 proc. (31) sudarė ankstyvosios stadijos atvejai, tarp vyrų dažniau nei tarp moterų: atitinkamai 34,7 proc. (26) ir 8,0 proc. (6). Latentinis sifilis sudarė 36,0 proc. (27) visų atvejų, 4,0 proc. (3) atvejų diagnozuotas simptominis neurosifilis, 12,0 proc. (9) sifilio diagnozių sudarė „*kitas ir nepatikslintas sifilis*“. Įgimto sifilio atveju diagnozuota ankstyvojo simptominio sifilio forma.

Analizuojant atvejų skaičių pagal lytį, nustatyta, kad sifilis 2023 m. diagnozuotas dažniau vyrams nei moterims – atitinkamai 68,0 proc., (51) ir 32,0 proc. (24).

3 grafikas. Užregistruotų sifilio atvejų pasiskirstymas pagal lytį 2013–2023 m.




Pagal amžiaus grupes, 48,7 proc. (37) sifilio atvejai registruoti 20–34 metų amžiaus asmenims, iš kurių 72,97 proc. (27) buvo vyrai. 41,2 proc. (21) atvejų registruoti 25–34 metų vyrų amžiaus grupėje. Moterų populiacijoje daugiausia atvejų nustatyta 30–34 metų amžiaus grupėje (6) (9 lentelė).

9 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2023 metais

Amžiaus grupė	Vyrų		Moterų		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
0–14	0	0,0	1*	4,0	1*	1,3
15–19	0	0,0	0	0	0	0
20–24	6	11,8	3	12,0	9	11,8
25–29	11	21,6	1	4,0	12	15,8
30–34	10	19,6	6	24,0	16	21,1
35–39	9	17,6	1	4,0	10	13,2
40–44	6	11,8	5	20,0	11	14,5
45–49	5	9,8	2	8,0	7	9,2
50–54	1	2,0	3	12,0	4	5,3
55+	3	5,9	3	12,0	6	7,9
<b>Iš viso</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

\* įtrauktas 1 įgimtas atvejis

4 grafikas. Užregistruotų įgyto sifilio atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2013–2023 m.



Analizuojant įgyto sifilio atvejų protokolus (40), kuriuose pažymėtas išsilavinimas, nustatyta, kad dauguma užsikrėtusiųjų (62,5 proc., 25) turėjo vidurinį; 22,5 proc. (9) – aukštąjį ir aukštesnįjį; 7,5 proc. (3) – pagrindinį; 7,5 proc. (3) – pradinį išsilavinimą. Pagal lytį daugiau vyrų (17,5 proc.) nei moterų (5 proc.) turėjo aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą. 35 užsikrėtusieji asmenys išsilavinimo nenurodė.

Analizuojant įgyto sifilio atvejų protokolus (48), kuriuose pažymėta socialinė grupė, nustatyta, kad 77,1 proc. (37) susirgusiųjų sifiliu buvo darbininkai ir tarnautojai, vyrų daugiau nei moterų (81,1 proc. ir 18,9 proc. atitinkamai). Moterų, daugiau nei vyrų, priklausė bedarbių socialinei grupei (10 lentelė).

10 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu pasiskirstymas pagal socialinę grupę 2023 metais

Socialinė grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Darbininkai	24	64,9	6	54,5	30	62,5
Tarnautojai	6	16,2	1	9,1	7	14,6
Bedarbiai	5	13,5	4	36,4	9	18,8
Studentai	1	2,7	0	0	1	2,1
Pensininkas	1	2,7	0	0	1	2,1
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	<i>14</i>		<i>13</i>		<i>27</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>51</b>		<b>24</b>		<b>75</b>	

Analizuojant socialinio draustumo duomenis (pažymėta 55 protokoluose), nustatyta, kad 96,4 proc. (53) asmenų buvo socialiai drausti, 3,6 proc. (2) nebuvo drausti. 21 protokole draustumas nenurodytas, nepažymėtas arba nežinomas.

Dauguma – 81,6 proc. (62) užsikrėtusiųjų sifiliu gyveno mieste ir 18,4 proc. (14) kaime.

Analizuojant protokolus pagal tai, kaip buvo nustatyta diagnozė, nustatyta, kad 39,5 proc. (30) užsikrėtusiųjų sifiliu kreipėsi patys į sveikatos priežiūros įstaigą; 31,6 proc. (24) – tiriant kaip kraujo donorus; 23,7 proc. (18) – tiriant profilaktiškai (pvz. stebint nėščiąsias); 1 atvejis – laisvės atėmimo vietoje; 1 atvejis – tiriant rizikos grupę, 2 atvejai – tiriant kontaktinius asmenis.

Pagal galimą užsikrėtimo būdą, 36,8 proc. (28) asmenys užsikrėtė heteroseksualių lytinių santykiu metu, iš kurių 67,9 proc. (19) buvo vyrai, 32,1 proc. (9) – moterys. 7 vyrai užsikrėtė homoseksualių santykių metu; vienas užsikrėtimo būdas – iš motinos vaikui ir vienas asmuo nurodė kitą galimą užsikrėtimo būdą. 51,3 proc. (39) asmenų užsikrėtimo būdo nežinojo arba nenurodė (11 lentelė).

11 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu pasiskirstymas pagal galimą užsikrėtimo būdą 2022 metais

Galimas užsikrėtimo būdas	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Heteroseksualinis kontaktas	19	37,3	9	36,0	28	36,8
Homoseksualinis kontaktas	7	13,7			7	9,2
Iš motinos vaikui	0	0	1	4,0	1	1,3
Kita	1	2,0	0	0,0	1	1,3
Nežinomas	23	45,1	15	60,0	38	50,0
Nenurodyta	1	2,0	1	0,0	1	1,3
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

Analizuojant heteroseksualinį galimą užsikrėtimo būdą pagal amžiaus grupes tiek vyrų, tiek moterų amžiaus grupėje, daugiausia atvejų registruota 25–44 metų amžiaus grupėje, tarp vyrų du kartus daugiau nei tarp moterų (12 ir 6 atvejai atitinkamai). Homoseksualinis perdavimo būdas (7 atvejai) registruotas taip pat 25–44 metų amžiaus vyrų grupėje. Vyresnių vyrų (45–64 metų amžiaus) grupėje registruoti 4 atvejai, o moterų šioje amžiaus grupėje – 1 įgyto sifilio atvejis.

Sifilio atvejai (22), kai žinomas ir protokoluose pažymėtas tariamas užsikrėtimo šaltinis – sutuoktinis (-ė) / sugyventinis (-ė) ar nuolatinis (-ė) lytinis (-ė) partneris (-ė), sudarė 45,5 proc. (10), pagal lytį pasiskirstymas vienodas – po 50,0 proc. Atsitiktinį lytinį partnerį, kaip infekcijos šaltinį, nurodė tik sifiliu užsikrėtę vyrai (5). Moterys, daugiau nei vyrai, kaip tariamą užsikrėtimo šaltinį nurodė sutuoktinį ar sugyventinį (62,5 proc. ir 37,5 proc. atitinkamai) (12 lentelė).

12 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu pasiskirstymas pagal tariamą užsikrėtimo šaltinį 2023 metais

Tariamasis užsikrėtimo šaltinis	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Atsitiktinis asmuo	5	31,3	0	0	5	22,7
Pažįstamas	6	37,5	1	16,7	7	31,8
Sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė)	3	18,8	5	83,3	8	36,4
Nuolatinis lytinis partneris	2	12,5	0	0	2	9,1
Tėvai	0	0	1	16,7	1	4,5
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
<i>Nežinomas, nenurodytas</i>	35		19		54	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>51</b>		<b>25</b>		<b>76</b>	

Pagal įgyto sifilio protokolų, kuriuose pažymėtas lytinių partnerių skaičius (37), duomenis, vieną lytinį (-ę) partnerį (-ę) per pastaruosius 12 mėnesių turėjo daugiau moterų nei vyrų ((60,0 proc. ir 40,0 proc. atitinkamai, (15)), 85,7 proc. vyrų (12) turėjo 2–3 partnerius (-es). Keturis ar daugiau partnerių turėjo 5 vyrai (13 lentelė). Vienas vyras teigė turėjęs santykių su lytines paslaugas teikiančiais asmenimis.

13 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėnesių 2023 metais

Partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėn.	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1	6	23,1	9	81,8	15	40,5
2–3	12	46,2	2	18,2	14	37,8
>= 4	5	19,2	0	0	5	13,5
Neturėjo	3	11,5	0	0	3	8,1
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta</i>	25		13		39	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>51</b>		<b>24</b>		<b>76</b>	

Atvejų protokolų (35), kuriuose buvo pažymėtas naudojimosi prezervatyvais dažnis, duomenimis, retai prezervatyvais naudojasi arba išvis nesinaudoja – 74,3 proc. (26), visada arba dažnai – 11,4 proc. (4) užsikrėtusiųjų. Daugiau nei pusė apklaustųjų (53,8 proc.) vyrų prezervatyvais, galinčiais apsaugoti nuo lytiškai plintančių infekcijų, jų nenaudoja. (14 lentelė).

14 lentelė. Užsikrėtusiųjų sifiliu naudojimosi prezervatyvais dažnumas 2023 metais

Naudojasi prezervatyvais	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Visada (100 proc.)	2	7,7	0	0	2	5,7
Dažnai (75–100 proc.)	2	7,7	0	0	2	5,7
Vidutiniškai (26–74 proc.)	4	15,4	1	11,1	5	14,3
Retai (1–25 proc.)	4	15,4	3	33,3	7	20,0
Nesinaudoja (0 proc.)	14	53,8	5	55,6	19	54,3
<b>Iš viso analizuota</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta</i>	25		9		35	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>51</b>		<b>24</b>		<b>75</b>	

Dėl šešių (4 vyrų ir 2 moterų) užsikrėtimo sifiliu atvejų buvo pradėtas kontaktinių asmenų nustatymas. Iš jų 4 asmenys nurodė vieną kontaktinį asmenį.

**Išvados:**

- Sergamumo sifiliu rodiklis 2023 m. siekė 2,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
- Aukščiausi sergamumo sifiliu rodikliai 2022 m. registruoti Vilniaus, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse.
- Užsikrėtusių vyrų – 2,1 karto daugiau nei moterų.
- 48,7 proc. užsikrėtusiųjų sifiliu 20–34 metų amžiaus grupės asmenys, iš kurių 72,97 proc. – vyrai.
- Dauguma užsikrėtusiųjų asmenų (96,4 proc.) buvo socialiai drausti ir 81,6 proc. gyveno mieste.
- 41,3 proc. sifilio atvejų nustatyta ankstyvose stadijose.
- Pagal galimą užsikrėtimo būdą (kai užsikrėtimo būdas žinomas), 36,8 proc. asmenų užsikrėtė heteroseksualių, 9,2 proc. – homoseksualių santykių metu. Užregistruotas 1 įgimto sifilio atvejis.
- Sutuoktinis (-ė) / sugyventinis (-ė) dažniausiai nurodytas, kaip tariamas užsikrėtimo šaltinis – 36,4 proc. atvejų.
- Per pastaruosius 12 mėnesių, 85,7 proc. vyrų turėjo 2–3 partnerius (-es). Keturis ar daugiau partnerių turėjo 5 vyrai. 1 partnerį turėjo daugiau moterų nei vyrų.
- Atvejų protokoluose, kuriuose buvo pažymėtas naudojimosi prezervatyvais dažnis, retai naudoja prezervatyvus arba nesinaudoja 74,3 proc. asmenų.
- Dėl šešių užsikrėtusių sifiliu atvejų buvo pradėtas kontaktinių asmenų nustatymas.

#### 4. GONORĖJOS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS


2023 m. Lietuvoje registruoti 38 gonorėjos atvejai. Aukščiausias sergamumo gonorėja rodiklis 2023 m. registruotas Vilniaus apskrityje (15 lentelė).

15 lentelė. Sergamumas gonorėja pagal apskritis, 2021–2023 m.

Eil. Nr.	Apskritys	Iš viso registruota susirgimų			Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv.		
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.	Vilniaus	17	29	31	0,20	0,35	0,36
2.	Kauno	10	3	3	0,18	0,05	0,05
3.	Klaipėdos	0	1	0	0,00	0,03	0,00
4.	Šiaulių	0	1	1	0,00	0,04	0,04
5.	Panevėžio	0	1	0	0,00	0,05	0,00
6.	Alytaus	1	1	1	0,07	0,07	0,07
7.	Marijampolės	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	Tauragės	1	0	1	0,11	0,00	0,11
9.	Telšių	1	2	1	0,08	0,15	0,08
10.	Utenos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>VISO</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>

Duomenų analizė pagal lytį parodė, kad dauguma – 84,2 proc. (32) užsikrėtusiųjų gonorėja buvo vyrai, 15,8 proc. (6) – moterys.

5 grafikas. Registruotų gonorėjos atvejų pasiskirstymas pagal lytį 2013–2023 m.




60,6 proc. (25) užsikrėtusiųjų gonorėja buvo 20–34 metų amžiaus asmenys, iš kurių 88,0 proc. – vyrai (16 lentelė).

16 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2023 m.

Amžiaus grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
0–14	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15–19	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20–24	9	28,1	1	16,7	10	26,3
25–29	9	28,1	1	16,7	10	26,3
30–34	4	12,5	1	16,7	5	13,2
35–39	6	18,8	2	33,3	8	21,1
40–44	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45–49	0	0,0	1	16,7	1	2,6
50–54	3	9,4	0	0,0	3	7,9
55+	1	3,1	0	0,0	1	2,6
<b>Iš viso</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

6 grafikas. Registruotų gonorėjos atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2013–2023 m.



Atvejų protokolų (30), kuriuose pažymėti kintamieji apie išsilavinimą, analizė parodė, kad 43,3 proc. (13) užsikrėtusiųjų turėjo aukštąjį, 46,7 proc. (14) – vidurinį išsilavinimą. Analizuojant protokolus (55), kuriuose pažymėtas socialinis draustumas, 96,4 proc. buvo socialiai drausti. 92,1 proc. (35 iš 38) – gyveno mieste.

Analizuojant protokuose (33) pažymėtus kintamuosius pagal socialinę grupę, nustatyta, kad 87,9 proc. (29) buvo darbininkai ir tarnautojai. (17 lentelė).

17 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja pasiskirstymas pagal socialinę grupę 2023 m.

Socialinė grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Darbininkai	13	48,1	2	33,3	15	45,5
Tarnautojai	11	40,7	3	50,0	14	42,4
Bedarbiai	1	3,7	1	16,7	2	6,1
Studentai	2	7,4	0	0,0	2	6,1
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	5		0		5	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>32</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	

Analizuojant protokolų duomenis apie galimą užsikrėtimo būdą, heteroseksualių santykių metu gonorėja užsikrėtė 65,8 proc. asmenų, iš kurių 80,0 proc. – vyrai; homoseksualių santykių metu užsikrėtė 23,7 proc. asmenų; 10,5 proc. atvejų užsikrėtimo būdas nežinomas. Analizuojant gonorėjos atvejus pagal lytį, žymiai daugiau atvejų nustatyta vyrams (18 lentelė).

18 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja pasiskirstymas pagal galimą užsikrėtimo būdą 2023 m.

Galimas užsikrėtimo būdas	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Heteroseksualinis kontaktas	20	62,5	5	83,3	25	65,8
Homoseksualinis kontaktas	9	28,1			9	23,7
Nežinoma	3	9,4	1	16,7	4	10,5
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

Protokolų, kuriuose pažymėtas tariamas užsikrėtimo šaltinis (24), duomenimis, 62,5 proc. gonorėja užsikrėtusių asmenų kaip užsikrėtimo šaltinį nurodė atsitiktinį asmenį; 5 atvejuose tariamu užsikrėtimo šaltiniu buvo įvardytas sutuoktinis (-ė) / sugyventinis (-ė) ar nuolatinis (-ė) lytinis (-ė) partneris (-ė) (19 lentelė).

19 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja pasiskirstymas pagal tariamą užsikrėtimo šaltinį 2023 metais

Tariamasis užsikrėtimo šaltinis	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Atsitiktinis asmuo	15	71,4	0	0	15	62,5
Pažįstamas	3	14,3	1	33,3	4	16,7
Sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė)	1	4,8	1	33,3	2	8,3
Nuolatinis lytinis partneris	2	9,5	1	33,3	3	12,5
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
<i>Nežinoma, nenurodyta</i>	11		3		14	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>32</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	

Protokolų, kuriuose pažymėtas lytinių partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėnesių (25), duomenimis, 44,0 proc. gonorėja susirgusių asmenų nurodė, jog per pastaruosius 12 mėnesių turėjo vieną lytinį partnerį, du ar tris bei keturis ir daugiau partnerių turėjo 56,0 proc. asmenų, iš kurių visi buvo užsikrėtusiųjų vyrų grupėje (20 lentelė).

Vienas užsikrėtusysis gonorėja nurodė, kad turėjo lytinių santykių su lytines paslaugas už atlygį teikiančiais asmenimis.

20 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėnesių 2023 m.

Partnerių skaičius per paskutiniuosius 12 mėn.	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1	7	33,3	4	100,0	11	44,0
2–3	7	33,3	0	0	7	28,0
>= 4	7	33,3	0	0	7	28,0
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	<i>11</i>		<i>2</i>		<i>13</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>32</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	

Analizuojant protokolus (23), kuriuose pažymėtas prezervatyvų naudojimosi dažnumas, nustatyta, kad 69,6 proc. asmenų prezervatyvais nesinaudoja arba naudojami retai (21 lentelė).

21 lentelė. Užsikrėtusiųjų gonorėja naudojimosi prezervatyvais dažnumas 2023 m.

Naudojasi prezervatyvais	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Visada (100 proc.)	1	5,0	0	0	1	4,3
Dažnai (75–100 proc.)	4	20,0	0	0	4	17,4
Vidutiniškai (26–74 proc.)	2	10,0	0	0	2	8,7
Retai (1–25 proc.)	7	35,0	3	100,0	10	43,5
Nesinaudoja (0 proc.)	6	30,0	0	0	6	26,1
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	<i>12</i>		<i>3</i>		<i>15</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>32</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	

41,2 proc. (14 iš 34 pažymėtų protokolų apie kontaktinius asmenis) užsikrėtimo gonorėja atvejų, dauguma – 64,3 proc. (9) užsikrėtusiųjų gonorėja nurodė vieną kontaktinį asmenį ir pradėtas kontaktinių asmenų išaiškinimas. 5 susirgusieji kontaktinių asmenų nenurodė.

**Išvados:**

- 2023 m. Lietuvoje registruoti 38 gonorėjos atvejai. Sergamumo gonorėja rodiklis 100 tūkst. gyventojų – 1,3 atvejo.
- Aukščiausias sergamumo gonorėja rodiklis registruotas Vilniaus apskrityje.
- Pagal lytį gonorėja dažniausiai diagnozuota vyrams.
- Pagal socialinį statusą daugiausia gonorėjos atvejų nustatyta miestų gyventojams, turintiems vidurinį išsilavinimą, darbininkams bei socialiai draustiems.
- 68,8 proc. užsikrėtusiųjų gonorėja buvo 20–34 metų amžiaus asmenys, iš kurių 88,0 proc. – vyrai.
- 62,5 proc. gonorėja užsikrėtusiųjų asmenų tariamu užsikrėtimo šaltiniu įvardijo atsitiktinį asmenį (visi vyrų grupėje).
- Daugiausia (44,0 proc.) gonorėja susirgusių asmenų nurodė, jog per pastaruosius 12 mėnesių turėjo vieną lytinį partnerį.
- 69,6 proc. užsikrėtusiųjų asmenų prezervatyvais nesinaudojo arba naudojos retai.

## 5. CHLAMIDIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 2023 METAIS


2023 m. Lietuvoje registruota 260 chlamidiozės atvejų. Sergamumo chlamidioze rodiklis 2023 m., lyginant su 2022 m., išliko panašus – 9,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Aukščiausi sergamumo chlamidioze rodikliai 2023 m. registruoti Vilniaus ir Kauno apskrityse, mažiausi – Telšių ir Marijampolės apskrityse (22 lentelė).

22 lentelė. Sergamumas chlamidioze pagal apskritis 2021–2023 m.

Eil. Nr.	Apskritys	Iš viso registruota susirgimų			Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv.		
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.	Vilniaus	143	134	129	1,76	1,61	1,50
2.	Kauno	62	84	87	1,09	1,46	1,49
3.	Klaipėdos	5	12	10	0,15	0,36	0,30
4.	Šiaulių	3	7	3	0,11	0,27	0,33
5.	Panevėžio	8	4	7	0,37	0,19	0,74
6.	Alytaus	6	5	10	0,44	0,37	0,22
7.	Marijampolės	1	4	3	0,07	0,29	0,22
8.	Tauragės	0	4	6	0,00	0,44	0,66
9.	Telšių	0	1	1	0,00	0,08	0,08
10.	Utenos	0	2	4	0,00	0,16	0,32
	<b>VISO</b>	<b>228</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>0,81</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>

Analizuojant 2023 metų duomenis pagal lytį, nustatyta, kad chlamidiozė diagnozuota dažniau vyrams nei moterims – atitinkamai 56,5 proc. (147) ir 43,5 proc. (113).

7 grafikas. Užregistruotų chlamidiozės atvejų pasiskirstymas pagal lytį 2013–2023 m.




64,2 proc. (167) užsikrėtusiųjų chlamidioze buvo 25–34 metų amžiaus grupėje. Diferencijuojant pagal lytį, 25–44 metų amžiaus grupėje žymiai daugiau chlamidiozės atvejų buvo tarp vyrų (113) nei moterų (54) (76,9 proc. ir 47, 8 proc. atitinkamai), tačiau daugiau chlamidiozės atvejų nustatyta tarp moterų (45) nei vyrų (22) 15–24 metų amžiaus grupėje (39,8 proc. ir 15,0 proc. atitinkamai) (23 lentelė).

23 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze asmenų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2023 m.

Amžiaus grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
0–14	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15–19	1	0,7	10	8,8	11	4,2
20–24	21	14,3	35	31,0	56	21,5
25–29	66	44,9	27	23,9	93	35,8
30–34	27	18,4	15	13,3	42	16,2
35–39	15	10,2	10	8,8	25	9,6
40–44	5	3,4	2	1,8	7	2,7
45–49	7	4,8	6	5,3	13	5,0
50–54	3	2,0	4	3,5	7	2,7
55+	2	1,4	4	3,5	6	2,3
<b>Iš viso</b>	<b>147</b>	<b>100,0</b>	<b>113</b>	<b>100,0</b>	<b>260</b>	<b>100,0</b>

8 grafikas. Užregistruotų chlamidinės atvejų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2013–2023 m.



Analizuojant protokolus (215), kuriuose pažymėtas išsilavinimas, nustatyta, kad 56,7 proc. (122) užsikrėtusiųjų turėjo vidurinį, 34,0 proc. (73) – aukštąjį, 3,3 proc. (7) – pagrindinį, 3,7 proc. (8) – aukštesnį išsilavinimą. 45 asmenų išsilavinimas nepažymėtas arba nežinomas.

Analizuojant susirgimus chlamidioze pagal gyvenamąją vietą, nustatyta, kad dauguma – 90,4 proc. (235) užsikrėtusiųjų chlamidioze pastoviai gyvena mieste, tik 9,6 proc. (25) – kaimo vietovėse.

Pagal protokolų duomenis, kuriuose pažymėtas draustumas (245), dauguma – 98,4 proc. (241) užsikrėtusiųjų chlamidioze buvo socialiai drausti, 1,6 proc. (4) socialinio draudimo neturėjo. 15 protokoluose ši informacija nenurodyta.

Analizuojant protokolų duomenis (kuriuose pažymėti kintamieji – 176) pagal socialinę grupę, nustatyta, kad 82,4 proc. (145) užsikrėtusiųjų buvo darbininkai ir tarnautojai (vyrų daugiau nei moterų – 55,9 proc. ir 44,1 proc. atitinkamai), studentų ir moterų daugiau nei vyrų (86,4 proc. ir 13,6 proc.) (24 lentelė).

24 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze asmenų pasiskirstymas pagal socialinę grupę 2023 m.

Socialinė grupė	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Darbininkai	39	44,3	38	43,2	77	91,7
Tarnautojai	42	47,7	26	29,5	68	81,0
Bedarbiai	1	1,1	0	0,0	1	1,2
Studentai	3	3,4	19	21,6	22	26,2
Moksleiviai	2	2,3	5	5,7	7	8,3
Pensininkai	1	1,1	0	0,0	1	1,2
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>176</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	59		25		84	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>147</b>		<b>113</b>		<b>260</b>	

66,5 proc. (169) užsikrėtusiųjų chlamidiozė buvo diagnozuota, kai jie kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą, 32,3 proc. (82) – tiriant profilaktiškai, 0,4 proc. (1) nustatytas stacionare, 0,8 proc. – tiriant kontaktinius asmenis (2), 6 atvejų (iš 260) registravimo protokoluose ši informacija neužfiksuota.

Analizuojant protokoluose informaciją apie galimą užsikrėtimo būdą, 80,4 proc. (209) asmenų chlamidioze užsikrėtė heteroseksualių (60,3 proc. vyrų ir 39,7 proc. moterų) ir 1,5 proc. (4) – homoseksualių santykių metu. (25 lentelė).

25 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze pasiskirstymas pagal galimą užsikrėtimo būdą 2023 m.

Galimas užsikrėtimo būdas	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Heteroseksualinis kontaktas	126	85,7	83	73,5	209	80,4
Homoseksualinis kontaktas	4	2,7			4	1,5
Nežinoma	17	11,6	30	26,5	47	18,1
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>147</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>260</b>	<b>100</b>

Analizuojant epidemiologinius protokolus (256) apie chlamidioze susirgusių asmenų tariamą užsikrėtimo šaltinį nustatyta, kad 25,0 proc. (64) užsikrėtimo šaltinis buvo sutuoktinis (-ė) ar sugyventinis (-ė), vyrų populiacijoje šis šaltinis buvo nurodytas dažniau nei moterų (54,7 proc. ir 45,3 proc. atitinkamai). Atsitiktinis asmuo, kaip galimas infekcijos šaltinis, vyrų populiacijoje buvo nurodomas dažniau, lyginant su moterų populiacija (73,9 proc. ir 26,1 proc.), taip pat dažniau vyrų nei moterų populiacijoje kaip užsikrėtimo šaltinis buvo nurodomi pažįstami asmenys (74,0 proc. ir 26,0 proc. atitinkamai). 34,4 proc. (88) teigė nežinantis, kas galėjo būti užsikrėtimo šaltinis (26 lentelė).

26 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze pasiskirstymas pagal tariamą užsikrėtimo šaltinį 2023 m.

Tariamasis užsikrėtimo šaltinis	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Atsitiktinis asmuo	13	8,9	6	5,5	19	7,4
Pažįstamas (-a)	37	25,3	13	11,8	50	19,5
Sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė)	35	24,0	29	26,4	64	25,0
Nuolatinis lytinis partneris	20	13,7	14	12,7	34	13,3
Nežinoma	41	28,1	47	42,7	88	34,4
Buvęs partneris	0	0,0	1	0,1	1	0,4
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>256</b>	<b>100</b>
<i>Nepažymėta</i>	<i>1</i>		<i>3</i>		<i>4</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>147</b>		<b>113</b>		<b>260</b>	

Protokolų (179), kuriuose pažymėti duomenys apie santykius su lytines paslaugas už atlygį teikiančiais asmenimis, analizė rodo, kad keturi vyrai turėjo tokių santykių, 175 asmenys (97,8 proc.) per pastaruosius 6 mėnesius lytinių santykių su asmenimis, teikiančiais lytines paslaugas už atlygį, neturėjo. 81 protokole ši informacija neužfiksuota.

Protokolų (208), kuriuose pažymėti duomenys apie lytinių partnerių skaičių per pastaruosius 12 mėnesių, analizė rodo, kad 53,8 proc. asmenų turėjo 1 lytinį partnerį; 2–3 partnerius turėjo daugiau vyrų nei moterų: 70,8 proc. (51) ir 29,2 proc. (21) atitinkamai; keturis ir daugiau partnerių turėjo daugiau vyrų: 84,6 proc. (11) ir 15,4 proc. (2) (27 lentelė).

27 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėnesių 2023 m.

Partnerių skaičius per pastaruosius 12 mėn.	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
1	56	45,2	56	66,7	112	53,8
2–3	51	41,1	21	25,0	72	34,6
>= 4	11	8,9	2	2,4	13	6,3
Neturėjo	6	4,8	5	6,0	11	5,3
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	<i>23</i>		<i>29</i>		<i>52</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>147</b>		<b>113</b>		<b>260</b>	

Analizuojant protokolų (199) informaciją apie prezervatyvų naudojimosi dažnį, matyti, kad 81,4 proc. (162) užsikrėtusiųjų naudojami retai arba iš viso nesinaudoja prezervatyvais; 9,5 proc. (19) užsikrėtusiųjų naudojami prezervatyvais visada arba dažnai. (28 lentelė).

28 lentelė. Užsikrėtusiųjų chlamidioze naudojimosi prezervatyvais dažnumas 2023 m.

Naudojasi prezervatyvais	Vyrai		Moterys		Iš viso	
	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.	Abs. sk.	Proc.
Visada (100 proc.)	6	5,2	1	1,2	7	3,5
Dažnai (75–100 proc.)	5	4,3	7	8,4	12	6,0
Vidutiniškai (26–74 proc.)	8	6,9	10	12,0	18	9,0
Retai (1–25 proc.)	34	29,3	20	24,1	54	27,1
Nesinaudoja (0 proc.)	63	54,3	45	54,2	108	54,3
<b>Iš viso analizuota protokolų</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>199</b>	<b>100</b>
<i>Nenurodyta / nepažymėta</i>	<i>31</i>		<i>30</i>		<i>61</i>	
<b>Iš viso gauta protokolų</b>	<b>147</b>		<b>113</b>		<b>260</b>	

92 chlamidioze užsikrėtusių asmenų atvejais pradėtas kontaktinių asmenų nustatymas. Iš jų, vieną kontaktinį asmenį nurodė 65,2 proc. (60) užsikrėtusiųjų, 4,3 proc. (4) – 2 asmenis, 3,3 proc. (3) – 3 asmenis, 2,2 proc. (4) – keturis asmenis. 22,8 proc. (21) užsikrėtęs asmuo kontaktinių asmenų nenurodė.

#### **Išvados:**

- 2023 m. Lietuvoje užregistruota 260 chlamidiozės atvejų. Sergamumo chlamidioze rodiklis 2023 m. siekė – 9,1 atvejo 100 tūkst gyventojų.
- Aukščiausi sergamumo chlamidioze rodikliai užregistruoti Vilniaus ir Kauno apskrityse.
- Pagal lytį chlamidiozė dažniausiai diagnozuota vyrams.
- 64,2 proc. užsikrėtusiųjų gonorėja buvo 25–34 metų amžiaus asmenys, iš kurių 68,9 proc. – vyrai.
- Pagal socialinį statusą gonorėja daugiausia sirgo miestų gyventojai, turintys vidurinį išsilavinimą, darbininkai ir tarnautojai, socialiai drausti asmenys.
- 25,0 proc. atvejų užsikrėtimo šaltinis buvo sutuoktinis (-ė) ar sugyventinis (-ė); vyrų populiacijoje dažniau nei moterų.
- Daugiausia (53,8 proc.) susirgusių asmenų nurodė, jog per pastaruosius 12 mėnesių turėjo vieną lytinį partnerį
- 81,4 proc. užsikrėtusiųjų chlamidioze prezervatyvais nesinaudojo arba naudojo retai.

## 6. DUOMENYS APIE ATLIKTUS TYRIMUS DĖL ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ<sup>4</sup>

2023 m. įstaigų pateikti duomenys apie atliktus tyrimus dėl lytiškai plintančių infekcijų ir ŽIV pateikta 33 lentelėje. 2023 m., lyginant su 2022 m., tyrimų dėl ŽIV padaugėjo 4,6 proc., iš jų – greitaisiais testais sumažėjo 7,0 proc. Greitieji testai dėl ŽIV sudarė 6,6 proc. visų atliktų tyrimų.

2023 m. lyginant su 2022 m., laboratorinių tyrimų dėl sifilio atlikta 4 381 tyrimu daugiau, greitųjų testų – 179 daugiau; laboratorinių tyrimų dėl gonorėjos buvo 845 daugiau, tyrimų dėl chlamidijos skaičius padidėjo 19,6 proc. Greitieji testai dėl sifilio sudarė 3,6 proc., dėl gonorėjos – 1,6 proc. ir 0,01 proc. dėl chlamidijos (33 lentelė).

33 lentelė. Įstaigų pateikti duomenys apie atliktus tyrimus 2021-2023 m.

	Atlikta tyrimų (iš jų greitaisiais testais)		
	2021 m.	2022 m.	2023 m.
ŽIV	227 304 (16 914)	233 150 (17 435)	243 822 (16 212)
Sifilis	202 817 (8 274)	203 019 (7 190)	207 400 (7369)
Gonokokinė infekcija	87 998 (467)	84 189 (736)	85 034 (1370)
Chlamidijų sukelta ir lytiškai santykiaujant plintanti liga	9 472 (11)	11 165 (15)	13 358 (2)

2023 m. daugiausia tyrimų dėl ŽIV atlikta Vilniaus ir Kauno apskrityse (34 lentelė). Didžiausia tyrimų dalis greitaisiais testais (41,6 proc.) dėl ŽIV buvo atlikta Alytaus apskrityje.

Tyrimų dėl sifilio skaičius 2023 m. padidėjo 2,2 proc. (2022 m. atlikta 203 019 tyrimų). Padidėjo ir dėl gonorėjos atliktų tyrimų skaičius 2023 m., lyginant su 2022 m., (85 034 ir 84 189 atitinkamai), padaugėjo ir dėl chlamidijos atliktų tyrimų 2023 m., lyginant su 2022 m., (13 358 ir 11 165 atitinkamai).

34 lentelė. Atliktų tyrimų skaičius pagal apskritis 2023 m.

Eil. Nr.	Apskritis	Atlikta tyrimų (iš jų greitaisiais testais)			
		ŽIV	Sifilis	Gonorėja	Chlamidiozė
1.	Vilniaus	114 421 (9 962)	94 880 (5 717)	40 706 (0)	4 837 (0)
2.	Kauno*	58 910 (1 460)	52 233 (366)	14 168 (224)	5 038 (0)
3.	Klaipėdos	32 970 (1 909)	28 135 (297)	15 738 (17)	1 424 (0)
4.	Šiaulių	12 892 (727)	9 872 (237)	2 432 (337)	749 (2)
5.	Panevėžio	16 873 (98)	14 985 (2)	4 401 (0)	514 (0)
6.	Alytaus	2 638 (1 098)	2 075 (465)	2 091 (312)	136 (0)
7.	Marijampolės	1 676 (0)	1 363 (0)	1 387 (0)	292 (0)
8.	Tauragės	1 799 (812)	2 488 (78)	267 93)	70 (0)
9.	Telšių	628 (16)	497 (0)	2 502(0)	130 (0)
10.	Utenos	1 015 (130)	934 (109)	1 469 (0)	169 (0)
	<b>Iš viso</b>	<b>243 822 (16 212)</b>	<b>207 400 (7 369)</b>	<b>85 034 (1 370)</b>	<b>13 358 (2)</b>

\* įtraukti tyrimai, atlikti LR Krašto apsaugos ministerijos padaliniuose

<sup>4</sup> Vadovaujantis statistinės ataskaitos forma. Nr. 65 „Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“.

## 7. DUOMENYS APIE ATLIKTUS TYRIMUS DĖL ŽIV PAGAL TIRIAMĄSIAS GRUPES<sup>5</sup>

2023 m. iš įstaigų gauti duomenys apie atliktus tyrimus dėl ŽIV pagal tiriamąsias grupes pateikti 35 lentelėje. 2023 m., kaip ir ankstesniais metais, dominavo dvi dėl ŽIV tiriamų asmenų grupės – kraujo donorai ir nėščiosios (46,9 ir 13,4 proc. atitinkamai nuo visų atliktų tyrimų). Per pastaruosius trejus metus padaugėjo atliktų tyrimų dėl ŽIV skaičius asmenims, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas (52,1 proc., iš jų greitaisiais testais – 85,1 proc.). Taip pat padaugėjo (60 proc.) atliktų ŽIV tyrimų migrantams ir pabėgėliams bei užsieniečiams (34,1 proc.).

2023 m. rizikos grupės, turėjusios didžiausią riziką užsikrėsti ŽIV, tirtos daugiausia greitaisiais atrankiniais testais (atitinkamai nuo visų atliktų tyrimų): asmenys, turintys daugiau negu vieną lytinį partnerį – 94,6 proc.; asmenys, vartojantys narkotines ir psichotropines medžiagas – 92,5 proc.; vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais – 95,9 proc.; lytines paslaugas teikiantys asmenys – 100,0 proc.; asmenys, turėję lytinių kontaktų su ŽIV užsikrėtusiuoju – 60,7 proc.

35 lentelė. Įstaigų pateikti duomenys apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes, 2021–2023 m.

Kodas	Tiriamosios grupės pavadinimas	Tirta (iš jų greitaisiais)		
		2021 m.	2022 m.	2023 m.
01	Tiriami pagal klinikinius požymius	7 624 (6 813)	9 124 (7 402)	7 744 (5 230)
02	Sergantys lytiškai plintančiomis infekcijomis	32 (0)	28 (1)	48 (6)
03	Turintys daugiau negu vieną lytinį partnerį	698 (652)	1 300 (1 250)	921 (871)
04	Sergantys tuberkulioze	392 (237)	390 (248)	415 (259)
05	Kraujo donorai	101 386 (0)	104 068 (0)	114 277 (0)
06	Nėščiosios	38 356 (1 814)	38 196 (1 365)	32 627 (1 704)
07	Savo noru besitikrinantys	8 104 (2 211)	8 014 (2 066)	10 030 (1 767)
08	Patekę į kardomojo kalnimo ar laisvės atėmimo vietas	6 950 (58)	7 404 (324)	5 947 (547)
09	Turėję profesinį kontaktą	195 (75)	178 (68)	238 (86)
10	Vartojantys narkotines ir psichotropines medžiagas	2 190 (1 666)	2 390 (2 049)	3 333 (3 084)
11	Teikiantys lytines paslaugas	15 (12)	67 (65)	24 (24)
12	Vyrai, turintys lytinių santykių su vyrais	552 (530)	718 (686)	690 (662)
13	Migrantai, pabėgėliai	350 (345)	491 (371)	560 (524)
14	Užsieniečiai	82 (1)	78 (2)	110 (4)
15	Asmenys, turėję lytinių kontaktų su ŽIV užsikrėtusiuoju	49 (25)	77 (53)	61 (37)
16	Kreipėsi dėl pažymos	3 869 (823)	1 430 (134)	953 (113)
17	Kiti	56 460 (1 652)	59 197 (1 351)	65 844 (1 294)
	<b>Iš viso</b>	<b>227 304 (16 914)</b>	<b>233 150 (17 435)</b>	<b>243 822 (16 212)</b>

<sup>5</sup> Vadovaujantis statistinės ataskaitos forma. Nr. 67 „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“.

# 1 PRIEDAS

37 lentelė. Sergamumas ŽIV infekcija, sifiliu Lietuvoje 2021–2023 metais pagal savivaldybes (*Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema forma Nr. 4 – sveikata, metinė*)

Apskritis, miestas, rajonas	ŽIV						Sifilis					
	Atvejų sk.			Rodiklis 10 tūkst. gyv.			Atvejų sk.			Rodiklis 10 tūkst. gyv.		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Alytaus m.	0	4	11	0	0,77	2,13	2	0	0	0,38	0	0
Druskininkai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alytaus r.	0	0	1	0	0	0,39	0	0	1	0	0	0,39
Lazdijų r.	0	2	0	0	1,13	0	0	0	0	0	0	0
Varėnos r.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,48	0,49	0,49
<b>Alytaus apskritis</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,44</b>	<b>0,89</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,22</b>	<b>0,07</b>	<b>0,15</b>
Kauno m.	7	7	22	0,23	0,23	0,72	23	8	5	0,77	0,27	0
Jonavos r.	1	3	0	0,24	0,73	0	0	5	4	0	1,21	0,96
Kaišiadorių r.	0	1	3	0	0,34	1,02	0	1	0	0	0,34	0
Kauno r.	1	5	1	0,11	0,51	0,10	2	0	1	0,21	0	0,10
Kėdainių r.	0	2	1	0	0,44	0,22	0	0	0	0	0	0
Prienų r.	0	1	3	0	0,40	1,21	0	0	0	0	0	0
Raseinių r.	0	0	1	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0
<b>Kauno apskritis</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>0,16</b>	<b>0,33</b>	<b>0,53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>
Klaipėdos m.	14	12	12	0,92	0,78	0,76	4	4	5	0,26	0,26	0,32
Palangos m.	1	2	2	0,59	1,15	1,11	0	0	0	0	0	0
Neringa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klaipėdos r.	0	1	2	0	0,16	0,3	0	0	0	0	0	0
Kretingos r.	2	2	1	0,53	0,53	0,27	0	0	0	0	0	0
Skuodo r.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,65
Šilutės r.	2	1	3	0,52	0,26	0,78	0	0	0	0	0	0
<b>Klaipėdos apskritis</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>0,59</b>	<b>0,55</b>	<b>0,59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,18</b>
Marijampolės sav.	1	1	1	0,18	0,18	0,18	0	1	2	0	0,18	0,37
Šakių r.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,38	0	0
Vilkaviškio r.	4	2	0	1,14	0,58	0	1	0	1	0,28	0	0,29
Kalvarijos sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazlų Rūdos sav.	0	1	0	0	0,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>Marijampolės apskritis</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0,36</b>	<b>0,29</b>	<b>0,07</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0,15</b>	<b>0,07</b>	<b>0,22</b>
Panevėžio m.	3	4	3	0,34	0,46	0,34	1	0	2	0,11	0	0,23
Biržų r.	0	2	0	0	0,89	0	0	0	0	0	0	0
Kupiškio r.	0	0	1	0	0	0,63	0	0	1	0	0	0,63
Panevėžio r.	0	0	1	0	0	0,28	0	0	2	0	0	0,56
Pasvalio r.	0	0	2	0	0	0,90	1	0	0	0,44	0	0
Rokiškio r.	1	0	0	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Panevėžio apskritis</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0,19</b>	<b>0,28</b>	<b>0,33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,09</b>	<b>0</b>	<b>0,24</b>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Šiaulių m.	4	4	4	0,40	0,38	0,37	2	2	2	0,20	0,19	0,18
Akmenės r.	1	1	0	0,51	0,52	0	0	0	0	0	0	0
Joniškio r.	2	1	6	0,95	0,48	2,94	0	1	1	0	0,48	0,49
Kelmės r.	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0,40	0,41
Pakruojo r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radviliškio r.	3	2	2	0,86	0,58	0,58	0	1	0	0	0,29	0
Šiaulių r.	2	0	6	0,49	0	1,48	2	1	0	0,49	0,25	0
<b>Šiaulių apskritis</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0,46</b>	<b>0,30</b>	<b>0,72</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0,15</b>	<b>0,23</b>	<b>0,15</b>
Jurbarko r.	0	1	2	0	0,40	0,80	0	0	0	0	0	0
Šilalės r.	1	0	0	0,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Tauragės r.	1	0	2	0,27	0	0,54	0	1	0	0	0,27	0
Pagėgių sav.	0	1	1	0	1,39	1,41	0	0	0	0	0	0
<b>Tauragės apskritis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,55</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
Mažeikių r.	2	0	1	0,39	0	0,19	1	1	1	0,19	0,19	0,19
Plungės r.	0	1	0	0	0,30	0	1	0	0	0,30	0	0
Telšių r.	1	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Rietavo sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Telšių apskritis</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
Visagino m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anykščių r.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,43	0	0,44
Ignalinos r.	0	0	4	0	0	2,86	0	1	0	0	0,70	0
Molėtų r.	1	0	0	0,59	0	0	3	0	0	1,76	0	0
Utenos r.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,53	0	0
Zarasų r.	0	1	0	0	0,68	0	0	1	1	0	0,68	0,69
<b>Utenos apskritis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,32</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0,47</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
Vilniaus m.	51	58	54	0,76	1,01	0,91	60	51	39*	1,07	0,89	0,66
Šalčininkų r.	0	1	2	0	0,34	0,67	3	2	0	1,00	0,67	0
Širvintų r.	1	0	1	0,67	0	0,68	0	0	0	0	0	0
Švenčionių r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,45	0
Ukmergės r.	1	2	2	0,29	0,59	0,59	0	1	0	0	0,29	0
Vilniaus r.	2	3	2	0,21	0,30	0,19	1	1	4	0,10	0,10	0,38
Trakų r.	0	0	1	0	0	0,29	2	0	0	0,62	0	0
Elektrėnų sav.	3	4	3	1,28	1,68	1,23	0	0	0	0	0	0
<b>Vilniaus apskritis</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>0,76</b>	<b>0,82</b>	<b>0,76</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>43*</b>	<b>0,81</b>	<b>0,67</b>	<b>0,50</b>
Kiti (užsieniečiai ir TM gyvenantys)	8	119	102									
<b>Iš viso Lietuvoje</b>	<b>121</b>	<b>252</b>	<b>267</b>	<b>0,43</b>	<b>0,89</b>	<b>0,93</b>	<b>117</b>	<b>86</b>	<b>76*</b>	<b>0,42</b>	<b>0,30</b>	<b>0,26</b>

\* - įtrauktas 1 įgimtas sifilio atvejis

38 lentelė. Sergamumas gonorėja, chlamidioze Lietuvoje 2021–2023 metais pagal savivaldybes (*Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema, forma Nr. 4 – sveikata, metinė*)

Apskritis, miestas, rajonas	Gonorėja						Chlamidiozė					
	Atvejų sk.			Rodiklis 10 tūkst. gyv.			Atvejų sk.			Rodiklis 10 tūkst. gyv.		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Alytaus m.	1	0	0	0,19	0	0	2	1	1	0,38	0,19	0,19
Druskininkai	0	1	1	0	0,50	0,39	0	1	1	0	0,50	0,39
Alytaus r.	0	0	0	0	0	0	2	1	8	0,78	0,39	3,14
Lazdijų r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varėnos r.	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0,96	0,97	0
<b>Alytaus apskritis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0,44</b>	<b>0,37</b>	<b>0,74</b>
Kauno m.	8	3	3	0,27	0,10	0,10	52	59	71	1,74	1,96	2,34
Jonavos r.	0	0	0	0	0	0	3	8	8	0,72	1,93	1,93
Kaišiadorių r.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1,01	0,34
Kauno r.	2	0	0	0,21	0	0	6	11	7	0,64	1,12	0,68
Kėdainių r.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0,22	0,44	0
Prienuų r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,40	0
Birštono r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raseinių r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kauno apskritis</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,18</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>62</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>1,09</b>	<b>1,46</b>	<b>1,49</b>
Klaipėdos m.	0	0	0	0	0	0	4	10	10	0,26	0,65	0,63
Palangos m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neringa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,50	0
Klaipėdos r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,16	0
Kretingos r.	0	1	0	0	0,27	0	0	0	0	0	0	0
Skuodo r.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,62	0	0
Šilutės r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Klaipėdos apskritis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,36</b>	<b>0,30</b>
Marijampolės sav.	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0,55	0,37
Šakių r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,38	0
Vilkaviškio r.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,28	0	0,29
Kalvarijos sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazlų Rūdos sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Marijampolės apskritis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0,07</b>	<b>0,29</b>	<b>0,22</b>
Panevėžio m.	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0,34	0,23	0,46
Biržų r.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0,43	0,44	0,45
Kupiškio r.	0	1	0	0	0,62	0	0	0	0	0	0	0
Panevėžio r.	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1,13	0,28	0,28
Pasvalio r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rokiškio r.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,36
<b>Panevėžio apskritis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0,37</b>	<b>0,19</b>	<b>0,33</b>
Šiaulių m.	0	1	1	0	0,10	0,09	2	4	0	0,20	0,38	0
Akmenės r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Joniškio r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,48	0
Kelmės r.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0,39	0	0,81
Pakruojo r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radviliškio r.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,29	0,29
Šiaulių r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,25	0
<b>Šiaulių apskritis</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27</b>	<b>0,11</b>
Jurbarko r.	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0,81	1,19
Šilalės r.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,47
Tauragės r.	1	0	1	0,27	0	0,27	0	2	2	0	0,53	0,54
Pagėgių sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tauragės apskritis</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,44</b>	<b>0,66</b>
Mažeikių r.	1	2	1	0,19	0,39	0,19	0	1	1	0	0,19	0,19
Plungės r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telšių r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rietavo sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Telšių apskritis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>0,15</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
Visagino m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anykščių r.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,89
Ignalinos r.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,72
Molėtų r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utenos r.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,27	0
Zarasų r.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0,68	0,69
<b>Utenos apskritis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>0,32</b>
Vilnius	16	27	30	0,29	0,47	0,50	133	130	124	2,38	2,26	2,09
Šalčininkų r.	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0,67	0	0,34
Širvintų r.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1,34	0,67	0,68
Švenčionių r.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,44	0	0,45
Ukmergės r.	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0,58	0,29	0,29
Vilniaus r.	0	1	0	0	0,10	0	3	0	1	0,31	0	0,10
Trakų r.	0	1	1	0	0,30	0,29	0	2	0	0	0,61	0
Elektrėnų sav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vilniaus apskritis</b>	<b>17*</b>	<b>29*</b>	<b>31*</b>	<b>0,20</b>	<b>0,35</b>	<b>0,36</b>	<b>143*</b>	<b>134*</b>	<b>129*</b>	<b>1,76</b>	<b>1,61</b>	<b>1,50</b>
Kiti (užsieniečiai)												
<b>Iš viso Lietuvoje</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>228</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>0,81</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>

\*pridėti užsieniečiai