

Ar žinote, kad...

Šalyse, kuriose buvo paskiepyta daugiau nei pusė jaunų mergaičių, ženkliai sumažėjo užsikrėtimo 16 ir 18 tipų ŽPV atvejų (68 proc.) ir genitalijų karpų atsiradimo atvejų (61 proc.), dėl kryžminės vakcinų apsaugos beveik trečdaliu (28 proc.) sumažėjo užsikrėtimo kitų tipų ŽPV (31, 33 ir 45 tipų) atvejų.

Dėl skiepų kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą.

Daugiau informacijos apie ŽPV:



Skiepai nuo ŽPV –
apsaugokime ateitį

Kas yra ŽPV?

Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) yra dažniausia lytiniu keliu plintanti infekcija, kuria bent kartą gyvenime užsikrečia 4 iš 5 lytiškai aktyvių žmonių. Didelės rizikos ŽPV (ypač 16 ir 18 tipo) gali sukelti ikivėžines ligas ir vėžį. Mažos rizikos ŽPV (6, 11, 42, 42 ir 44 tipai) sukelia įvairius odos, viršutinių kvėpavimo takų, lytinių organų sistemos gleivinių pažeidimus. Nuo pavojingiausių šio viruso tipų apsisaugoti galima skiepais.

Skiepijami vaikai, sulaukę 11 metų – ir berniukai, ir mergaitės

11 metų mergaitės nuo ŽPV Lietuvoje visuotinai skiepyti pradėtos 2016 m., berniukai – 2023 m. Nuo 2023 m. vasario 1 d. vaikų skiepjimui nuo ŽPV naudojama devynvalentė ŽPV vakcina, apsauganti nuo ligų, kurias sukelia 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ar 58 tipo ŽPV.

Kodėl būtina skiepyti mergaites?

ŽPV gali sukelti gimdos kaklelio, makšties ir išorinių lytinių organų ikivėžines ligas ir vėžį.

Kodėl būtina skiepyti ir berniukus?

Nes būtent vyrai – dabartiniai paaugliai berniukai – dažnai yra ŽPV nešiotojai ir ateityje gali užkrėsti moteris – savo partneres. Be to, ŽPV ir vyrams sukelia ikivėžines ligas (išangės ir varpos) ar net vėžį.

Abiejų lyčių žmonėms šie virusai gali sukelti burnos, ryklės, gerklų, liežuvio šaknies ar net seilių liaukų bei tonzilių ikivėžines ligas bei vėžį. Vėžiui vystytis reikia laiko – tai gali užtrukti 10-15 metų ir daugiau, tačiau kartais tai trunka vos metus.

Skiepai nuo ŽPV yra veiksmingi ir saugūs

Tyrimų duomenimis, skiepai nuo ŽPV:

- 100 proc. apsaugo nuo 16 ir 18 ŽPV tipų sukeltų ikivėžinių gimdos kaklelio pokyčių;
- 90 proc. apsaugo jaunuolius nuo lytinių organų karpų bei ikivėžinių varpos ligų;
- 78 proc. apsaugo nuo išangės ligų, kurias sukelia mažos rizikos (6 ir 11) bei didelės rizikos (16 ir 18) ŽPV.

